

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN PARA COLONOSCOPIA CON TRILYTE (SPLIT)

NOMBRE _____

FECHA _____ **HORA** _____

Debe hablar con alguien en el centro quirúrgico para confirmar su cita 2 días antes de su procedimiento.

INSTRUCCIONES GENERALES:

- No tome medicamentos antiinflamatorios como Mobic, Ibuprofen, Advil, Motrin, Naproxen, Aleve, Celebrex, Bextra o otros medicamentos para la artritis durante 5 días antes de su procedimiento. Tylenol (acetaminofeno) está permitido.
- Hable con su médico si está tomando ASPIRINA, PRADAXA, XARELTO, PLAVIX, COUMADIN, HEPARIN, ELIQUIS, EFFIENT, BRILINTA o cualquier medicamento para diluir la sangre o prevenir la coagulación.
- Los aceites de pescado, las vitaminas Omega y la vitamina E deben suspenderse 5 días antes.
- Tome sus medicamentos para PRESIÓN ARTERIAL, CORAZÓN y PULMÓN la mañana de su procedimiento con un sorbo muy pequeño de agua.

DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Comience una dieta de líquidos claros desde la mañana (No sólidos ni productos Lácteos). Es importante beber muchos líquidos claros para prevenir la deshidratación. Trate de beber al menos 8 onzas de líquido cada hora del Día.

PASO 2: A las 8:00 a.m., mezcle la solución añadiendo agua al tiempo hasta la Línea superior de la botella plástica, agítelo y mézclelo bien refrigerar la solución (será incolora).

PASO 3: A las 6:00pm comience a beber la preparación de Trilyte. Beba 1 vaso de 8 onzas cada 15 minutos hasta terminar la mitad de la botella. Si tiene náuseas pare 15 minutos y entonces beba otra vez. Puede continuar líquidos claros hasta media noche si lo desea.

MAÑANA DE PROCEDIMIENTO: Su último vaso debe ser terminado 5 horas antes de la hora de cita

PASO 4: 4 HORAS 4 horas antes de la hora de su cita, comience a beber el resto de la solución un vaso de 8 onzas cada 15 minutos hasta terminar la botella (si tiene náuseas pare 15 minutos y vuelva a beber).

******Nada de comer o beber después de media noche, excepto para el paso 3 y 4, sus comidas de la mañana con muy poca cantidad de agua******